Fresubin® HEPA Drink

Im Aroma Cappuccino erhältlich



Nährwerttabelle

Typanalyse		pro 100 ml	pro 200 ml = 1 Drink
Energiewert	kcal	130	260
	(kj)	(550)	(1100)
Fett (33 %E)	g	4.7	9.4
davon gesättigte Fettsäuren	g	2	4
MCT	g	1.7	3.4
davon einfach ungesättigte Fettsäuren	g	1.4	2.8
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren	g	1.3	2.6
Kohlenhydrate (53.5 %E)	g	17.4	34.8
davon Zucker	g	0.7	1.4
davon Laktose	g	≤ 0.01	≤ 0.02
Nahrungsfasern (1.5 %E)	g	1	2
Protein (12 %E)	g	4	8
Salz (Na x 2.5)	g	0.19	0.38
Wasser	ml	78	156
Osmolarität	mosmol/l	360	
Mineralstoffe und Spurenelemente			
Natrium	mg	75	150
Kalium	mg	120	240
Chlorid	mg	71.5	143
Calcium	mg	80	160
Magnesium	mg	27	54
Phosphor	mg	53	106
Eisen	mg	1.33	2.66
Zink	mg	1.2	2.4
Kupfer	mg	0.13	0.26
Mangan	mg	0.27	0.54
Jod	µg	13.3	26.6
Fluorid	mg	0.13	0.26
Cholin	mg	28	56
Chrom	µg	6.67	13.34
Molybdän	µg	10	20
Selen	µg	6.67	13.34
Vitamine			
Vitamin A (davon β-Carotin)	µg RE	92 (22)	184 (44)
Vitamin D3	µg	1	2
Vitamin E	mg α -TE	1.33	2.66
Vitamin K	µg	6.67	13.34
Vitamin B1	mg	0.13	0.26
Vitamin B2	mg	0.17	0.34
Niacin	mg	1.6	3.2
	mg NE	2.3	4.6
Vitamin B6	mg	0.16	0.32
Vitamin B12	µg	0.27	0.54
Pantothensäure	mg	0.47	0.94
Biotin	µg	5	10
Folsäure	µg	27	54
Vitamin C	mg	6.67	13.34

%E = Energieanteil
RE = Retinoläquivalent, 1 mg RE = 6 mg alltrans β-Carotin, 1 IE = 0.3 µg RE;
α-TE = Alfa-Tocopheroläquivalent, 1 IE = 0.67 mg TE
NE = Niacinäquivalent

Produktinformationen

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke
Vollbilanzierte, energiereiche (1.3kcal/ml) Trinknahrung. Mit Nahrungsfasern, mit zusätzlichen BCAA (verzweigtkettigen Aminosäuren) und MCT (mittelkettige Triglyceride). Laktosefrei. Glutenfrei. Zum Diätmanagement bei bestehender oder drohender Mangelernährung, insbesondere bei akutem oder chronischem Leberversagen.

Dosierungsempfehlungen
2-3 Flaschen pro Tag zur ergänzenden Ernährung oder 7-8 Flaschen pro Tag zur ausschliesslichen Ernährung oder nach ärztlicher Empfehlung.

Wichtige Hinweise
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Zur ausschliesslichen Ernährung geeignet.

Kontraindikationen
Nicht geeignet, wenn eine enterale Ernährung kontraindiziert ist sowie bei Intoleranz gegen einen in Fresubin® HEPA Drink enthaltenen Inhaltsstoff. Nicht geeignet bei Galaktosämie. Nicht geeignet für Kinder < 3 Jahren. Bei Kindern < 6 Jahren mit Vorsicht verwenden.

Lagerung und Anwendung
Bei Raumtemperatur lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank lagern und innerhalb 24 Stunden verbrauchen. Vor Gebrauch gut schütteln. Langsam trinken!

Zutaten

Cappuccino: Wasser, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sojaöl), mittelkettige Triglyceride (MCT), Sojaeiweiss, Sojapolysaccharide, Milcheiweiss, L-Leucin, Aromen (mit Weizenmaltodextrin), L-Valin, L-Argininhydrochlorid, Kaliumcitrat, L-Isoleucin, Calciumphosphat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Süssungsmittel (Natrium Cyclamat, Natrium Saccharin), Cholinchlorid, Vitamin C, Säureregulator (E 330), Magnesiumoxid, Calciumcarbonat, Eisensulfat, Verdickungsmittel (E 407), Zinksulfat, Niacin, Vitamin E, Manganchlorid, Pantothensäure, Natriumfluorid, Vitamin B2, Vitamin B6, Kupfersulfat, Vitamin B1, Vitamin A, Beta-Carotin, Folsäure, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Natriumselenit, Biotin, Vitamin K1, Vitamin D3, Vitamin B12.

1. Plauth M, Cabre E, Riggio O, et al. ESPEN guidelines on enteral nutrition: liver disease. Clin Nutr. 2006; 25(2): 285-294. **2.** Amodio P, Bemeur C, Butterworth R, et al. The Nutritional Management of Hepatic Encephalopathy in Patients With Cirrhosis: International Society for Hepatic Encephalopathy and Nitrogen Metabolism Consensus. Hepatology. 2013; 58(1): 325-336. **3.** Gluud LL, Dam G, Les I, et al. Branched-chain amino acids for people with hepatic encephalopathy. Cochrane Library. 2007. CD001939. **4.** Kawaguchi T, Taniguchi E, Sata M. Effects of oral branched-chain amino acids on hepatic encephalopathy and outcome in patients with liver cirrhosis. Nutrition in Clinical Practice. 2013; 28(5) 580-588. **5.** Ginés P, Angeli P, Lenz K, et al. European Association for the Study of the Liver. EASL clinical practice guidelines on the management of ascites, spontaneous bacterial peritonitis, and hepatorenal syndrome in cirrhosis. J Hepatol. 2010; 53(3): 397-417. **6.** Runyon BA. Management of adult patients with ascites due to cirrhosis: an update. Hepatology. 2009; 49(6): 2087-2107. **7.** Babayan VK. Medium chain triglycerides and structured lipids. Lipids. 1987; 22(6): 417-420.

Bestellinformationen (4 x 200 ml)

Aroma	Artikel-Nr.	Pharmacode
Cappuccino	8185601	7848112

FRESENIUS KABI
caring for life

Fresenius Kabi (Schweiz) AG
Am Mattenhof 4, 6010 Kriens
www.fresenius-kabi.ch

Telefon 041 552 70 00
InfoLine 0800 800 877
InfoMail@fresenius-kabi.com

EN-2023-460/1-d

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.10) am 25.11.2026 um 01:30 Uhr · sana.swiss