Fresubin® HEPA Drink

Disponible en arôme cappuccino



Valeurs nutritives

Composition		per 100 ml	per 200 ml = 1 Drink
Valeur énergétique	kcal	130	260
	(kj)	(550)	(1100)
Lipides (33 %E)	g	4.7	9.4
dont acides gras saturés	g	2	4
TCM	g	1.7	3.4
dont acides gras monoinsaturés	g	1.4	2.8
dont acides gras polyinsaturés	g	1.3	2.6
Glucides (53.5 %E)	g	17.4	34.8
dont sucres	g	0.7	1.4
dont lactose	g	≤ 0.01	≤ 0.02
Fibres (1.5 %E)	g	1	2
Protéines (12 %E)	g	4	8
Sel (Na x 2.5)	g	0.19	0.38
Eau	ml	78	156
Osmolarité	mosmol/l	360	
Sels minéraux et oligoéléments			
Sodium	mg	75	150
Potassium	mg	120	240
Chlore	mg	71.5	143
Calcium	mg	80	160
Magnésium	mg	27	54
Phosphore	mg	53	106
Fer	mg	1.33	2.66
Zinc	mg	1.2	2.4
Cuivre	mg	0.13	0.26
Manganèse	mg	0.27	0.54
Iode	µg	13.3	26.6
Fluor	mg	0.13	0.26
Choline	mg	28	56
Chrome	µg	6.67	13.34
Molybdène	µg	10	20
Sélénium	µg	6.67	13.34
Vitamines			
Vitamine A (dont β-Carotène)	µg RE	92 (22)	184 (44)
Vitamine D3	µg	1	2
Vitamine E	mg α -TE	1.33	2.66
Vitamine K	µg	6.67	13.34
Vitamine B1	mg	0.13	0.26
Vitamine B2	mg	0.17	0.34
Niacine	mg	1.6	3.2
	mg NE	2.3	4.6
Vitamine B6	mg	0.16	0.32
Vitamine B12	µg	0.27	0.54
Acide pantothénique	mg	0.47	0.94
Biotine	µg	5	10
Acide folique	µg	27	54
Vitamine C	mg	6.67	13.34

%E = part d'énergie
RE = équivalent rétinol, 1 mg RE = 6 mg alltrans β-Carotène, 1 IE = 0.3 µg RE;
α-TE = équivalent alpha-tocophérol, 1 IE = 0.67 mg TE
NE = équivalent niacine

Informations de produit

Denreé alimentaires déstinés à des fins médicales spéciales
Supplément nutritif oral totalement équilibré, hypercalorique (1,3 kcal/ml) avec fibres. Avec BCAA supplémentaire (acides aminés à chaîne ramifiée). Avec TCM. Sans lactose. Sans gluten. Pour les besoins nutritionnels des patients malnutris ou à risque de malnutrition, en particulier des patients souffrant d'une insuffisance hépatique aigue ou chronique.

Dosage
2-3 bouteilles/jour pour une nutrition orale partielle ou 7-8 bouteilles/jour pour une nutrition complète, ou selon la recommandation d'un médecin.

Remarques importantes
A utiliser uniquement sous surveillance médicale. Convient pour une nutrition complète.

Contre-indications
Ne convient pas si une nutrition entérale est contre-indiquée ainsi qu'en cas d'intolérance à l'un des ingrédients contenus dans la boisson Fresubin® HEPA Drink. Ne convient pas en cas de galactosémie. Ne convient pas aux enfants < 3 ans. Utiliser avec précaution chez les enfants < 6 ans.

Utilisation et Stockage
Conserver à température ambiante (15-25 °C). Après ouverture, à conserver au réfrigérateur et à consommer dans les 24 heures.

Ingrédients

Cappuccino: Eau, maltodextrine, huiles végétales (huile de colza, huile de soja), triglycérides à chaînes moyennes (TCM), protéines de soja, polysaccharides de soja, protéines de lait, L-leucine, aromes (avec maltodextrine de blé), L-valine, L-arginine hydrochloride, citrate de potassium, L-isoleucine, phosphate de calcium, citrate de sodium, citrate de magnésium, édulcorants (cyclamate de sodium, saccharine de sodium), chlorure de choline, vitamine C, correcteur d'acidité (E 330), oxyde de magnésium, carbonate de calcium, sulfate de fer, épaississant (E 407), sulfate de zinc, niacine, vitamine E, chlorure de manganèse, acide pantothénique, fluorure de sodium, vitamine B2, vitamine B6, sulfate de cuivre, vitamine B1, vitamine A, β-carotène, acide folique, chlorure de chrome, molybdate de sodium, iodure de potassium, sélénite de sodium, biotine, vitamine K1, vitamine D3, vitamine B12.

1. Plauth M, Cabre E, Riggio O, et al. ESPEN guidelines on enteral nutrition: liver disease. Clin Nutr. 2006; 25(2): 285-294. **2.** Amodio P, Bemeur C, Butterworth R, et al. The Nutritional Management of Hepatic Encephalopathy in Patients With Cirrhosis: International Society for Hepatic Encephalopathy and Nitrogen Metabolism Consensus. Hepatology. 2013; 58(1): 325-336. **3.** Gluud LL, Dam G, Les I, et al. Branched-chain amino acids for people with hepatic encephalopathy. Cochrane Library. 2007. CD001939. **4.** Kawaguchi T, Taniguchi E, Sata M. Effects of oral branched-chain amino acids on hepatic encephalopathy and outcome in patients with liver cirrhosis. Nutrition in Clinical Practice. 2013; 28(5) 580-588. **5.** Ginés P, Angeli P, Lenz K, et al. European Association for the Study of the Liver. EASL clinical practice guidelines on the management of ascites, spontaneous bacterial peritonitis, and hepatorenal syndrome in cirrhosis. J Hepatol. 2010; 53(3): 397-417. **6.** Runyon BA. Management of adult patients with ascites due to cirrhosis: an update. Hepatology. 2009; 49(6): 2087-2107. **7.** Babayan VK. Medium chain triglycerides and structured lipids. Lipids. 1987; 22(6): 417-420.

Informations de commande (4 x 200 ml)

Arôme	N° d'article	Pharmacode
Cappuccino	8185601	7848112

FRESENIUS KABI
caring for life

Fresenius Kabi (Schweiz) AG
Am Mattenhof 4, 6010 Kriens
www.fresenius-kabi.ch

Telefon 041 552 70 00
InfoLine 0800 800 877
InfoMail@fresenius-kabi.com

EN-2023-460/1-f

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.10) am 25.11.2026 um 01:30 Uhr · sana.swiss